

ZALECENIA PO EKSTRAKCJI ZĘBA

1. Opatrunek (gazik) założony przez chirurga należy trzymać przygryziony w ustach przez pół godziny.
2. Nie wolno jeść aż do czasu ustąpienia znieczulenia. Przez 12 godzin po zabiegu nie wolno jeść i pić gorących posiłków.
3. Przeciwwskazane jest palenie papierosów do 24 godzin po zabiegu.
4. Zaleca się stosowanie na policzku zimnego okładu w okolicy zabiegu przez kolejne 2 dni.
5. Pierwsze mycie zębów może nastąpić po 12 godzinach od zabiegu, przy czym płukanie jamy ustnej należy wykonać bardzo ostrożnie. Nie wolno dotykać niczym rany.
6. Przez 7 dni należy zrezygnować z dużego wysiłku fizycznego, np. ćwiczeń siłowych i dźwigania.
7. Po 24 godzinach od zabiegu można rozpocząć płukanie jamy ustnej, płukanką z chlorheksydyną. Zaleca się delikatne płukanie.
8. **W razie bólu, obrzęku lub innych niepokojących objawów należy NIEZWŁOCZNIE umówić się na wizytę kontrolną.**
9. **Proszę unikać nabiału. Przez 5 dni nie jeść białego sera, jogurtu, kefiru itp.**

KOD RECEPTY

Antybiotyk:

Dodatkowe leki:

ZALECENIA PO EKSTRAKCJI ZĘBA

1. Opatrunek (gazik) założony przez chirurga należy trzymać przygryziony w ustach przez pół godziny.
2. Nie wolno jeść aż do czasu ustąpienia znieczulenia. Przez 12 godzin po zabiegu nie wolno jeść i pić gorących posiłków.
3. Przeciwwskazane jest palenie papierosów do 24 godzin po zabiegu.
4. Zaleca się stosowanie na policzku zimnego okładu w okolicy zabiegu przez kolejne 2 dni.
5. Pierwsze mycie zębów może nastąpić po 12 godzinach od zabiegu, przy czym płukanie jamy ustnej należy wykonać bardzo ostrożnie. Nie wolno dotykać niczym rany.
6. Przez 7 dni należy zrezygnować z dużego wysiłku fizycznego, np. ćwiczeń siłowych i dźwigania.
7. Po 24 godzinach od zabiegu można rozpocząć płukanie jamy ustnej, płukanką z chlorheksydyną. Zaleca się delikatne płukanie.
8. **W razie bólu, obrzęku lub innych niepokojących objawów należy NIEZWŁOCZNIE umówić się na wizytę kontrolną.**
9. **Proszę unikać nabiału. Przez 5 dni nie jeść białego sera, jogurtu, kefiru itp.**

KOD RECEPTY

Antybiotyk:

Dodatkowe leki: